

هناك بعض الأخطاء البسيطة التي يمكن أن تقع فيها عند إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية، تلك الأخطاء البسيطة تقلل من كفاءة التحصينات وتجعلنا نتشكي في كفاءة اللقاحات ونشكك في الشركات المنتجة لها... إلخ ولضمان نجاح عملية التحصين، يجب أن نتبع النصائح العامة التالية:

- الثلاجة العادية في درجة بروفة -٢٨ درجة مئوية لحين استعماله، ما لم يدون المنتج على العبوة غير ذلك، مع مراعاة عدم وضع العبوة في مجمد الثلاجة (الفريزر) إلا بناء على تعليمات من المنتج، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.
- تخرج اللقاحات من الثلاجة قبل استعمالها بساعتين أو ثلاثة ساعات في درجة حرارة جسم الحيوان عند استعمالها لتفادي حدوث صدمة لوضع حقن اللقاح في حاول الجسم مقاومته وتحجيمه وتضاؤل الاستفادة من.
- تخزين جميع اللقاحات في درجة الحرارة العادي في درجة بروفة -٢٠ درجة مئوية لحين استعماله، ما لم يدون المنتج على العبوة غير ذلك، مع مراعاة عدم وضع العبوة في مجمد الثلاجة (الفريزر) إلا بناء على تعليمات منتج اللقاح المدونة على العبوة بكل دقة مثل: التخزين - درجة الحرارة - الخلط والرج - طريقة الحقن - تاريخ انتهاء الصلاحية ... إلخ.
- التأكد من أن مصدر اللقاح موثوق منه تماماً والتأكد من نقله إلى المزرعة بطريقة صحيحة وأمنة.
- ملاحظة تدوين رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية لكل عبوة للرجوع إليها عند الحاجة، كما يجب التأكد من سلامية غلق العبوة ولون اللقاح أو المصل... إلخ
- تخزين جميع اللقاحات في درجة الحرارة العادي في درجة بروفة -٢٠ درجة مئوية لحين استعماله، ما لم يدون المنتج على العبوة غير ذلك، مع مراعاة عدم وضع العبوة في مجمد الثلاجة (الفريزر) إلا بناء على تعليمات منتج اللقاح المدونة على العبوة كل دقة مثل: التخزين - درجة الحرارة - الخلط والرج - طريقة الحقن - تاريخ انتهاء الصلاحية ... إلخ.



نصائح عامة لرفع كفاءة اللقاحات والتحصينات



د. مصطفى فايز

يجب اتباع تعليمات منتج اللقاح المدونة على العبوة، ويجب التأكد من مصدر اللقاح، ومراجعة رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية

تخزن جميع اللقالات والأمصال في الثلاجة العاديّة، ويتم إخراجها من الثلاجة قبل استعمالها بساعتين أو ثلاث وستعمل عندما تكون في درجة جسم الحيوان

مرور ٣-٤ أسابيع من الجرعة الأولى لضمان رفع كفاءة ومستوى اللقاح بجسم الحيوان لأقصى درجة ثم يكرر إعطاء اللقاح.

٩- يستعمل سن لحقن كل حيوان على حدة لتفادي انتقال الأمراض من حيوانات قد تكون مصابة بأمراض ما إلى حيوانات أخرى سليمة، أما إذا اضطررنا إلى استعمال السن لأكثر من حيوان فيجب غمر السن بعد كل استعمال في ماء مقطر نظيف درجة حرارته لا تقل عن ٨٠ درجة مئوية ثم تجفيفه بالنظر بعد ذلك قبل إعادة استعماله لحيوانات أخرى.

يجب التأكد من أن درجة حرارة المادة المذيبة مطابقة لدرجة حرارة اللقاح المحفوظ تحت الضغط والتجميد، كما يجب إضافة المذيب ودرج المخلوط بعد ذلك برفق للحفاظ على حيوية وفاعلية اللقاح.

٧- ترج العبوة برفق قبل الاستعمال وأثناء الاستعمال لضمان تجنب انتشار محتوى اللقاح من الفيروس أو البكتيريا وبالتالي حصول كل حيوان على المقرر له من محتوى اللقاح.

٨- عند استعمال أي لقاح لأول مرة عادة يستحسن إعطاء جرعة أولى ثم جرعة معتدلة لنشاط الجرعة الأولى (جرعة تشطيشية) بعد