

يعتبر السمان طائرًا اقتصاديًا لانتاج البيض واللحم إلى جانب الدجاج؛ حيث إنه طائر صغير نسبياً ويتأقلم بسهولة مع التربية المكثفة، وهو طائر سريع النمو والتنفس الجنسي، كما يتميز بمعدل عالٍ لانتاج البيض والمقاومة العالية للأمراض، فلا يحتاج إلى التحصينات الدورية للدجاج. لذلك فمن المتوقع أن يزداد انتشار مزارع السمان في السنوات المقبلة وتصبح بديلاً قوياً لمزارع الدجاج.

من المتوقع انتشار مزارعه خلال السنوات المقبلة

البيئة المثالية للتربية السمان

- ٤- مقاومة السمان للأمراض عالية نسبياً بالمقارنة بأنواع الدجاج الأخرى.
- ٥- المساحة المطلوبة للتربية صغيرة نسبياً (٨٠ - ١٠٠ طائر/م).
- وفي الوقت نفسه إذا كان المشروع لإنتاج البيض فنلاحظ أن إنتاج البيض عالٍ جداً فهو ٣٠٠ بيضة لكل طائر في السنة. وإذا كان المشروع للتربية فنلاحظ أن



د. مصطفى فايز
أستاذ الطب البيطري- جامعة فناة
السويس

مميزات طائر السمان:

- ١- مدة التسمين قصيرة نسبياً (٣٦ يوماً تقريباً).
- ٢- تستهلك السمانة (٥٠٠ - ٦٠٠ جم على فل خلال مدة التربية (٣٦ يوماً) حيث يصل وزن السمانة إلى ٢٠٠ جم في المتوسط أي بمعدل تحويل ٢.٧٪.
- ٣- يتميز لحم السمان بجودة الطعم وقلة الكوليسترول.

■ يرتبط وزن السمان ارتباطاً وثيقاً بتركيبة العلف ويتم تسويقه عند عمر ٣٧ يوماً حيث يكون متوسط الوزن ١٩٠ جم تقريراً

يتوقف تقليل البيض، وتكون درجة حرارة المفكس ٢٣٧.٢ ± ٩٩.٥ فـ٪ والرطوبة النسبية ٧٠ ٪.

التحضين:

تحضن كتاكيت السمان عند ٤٦ درجة وتنخفض درجة الحرارة درجتين أسبوعياً حتى عمر ٢٨ يوماً. مع مراعاة رفع درجة الحرارة درجتين عن معدلها في حالة ظهور أي أعراض مرضية.


- يجب توخي الحررص في الأسبوع الأول من العمر حتى لا تفرق الكتاكيت في سقایات المياه (يمكن وضع بعض الحصى لمنع الكتاكيت من النزول في المياه).

- توضع فرشة عميقة $١٠-٥$ سم من نشار الخشب في التربية الأرضية، وينشر العلف فوق ورق الجرائد أو شكائر العلف الفارغة خلال الأسبوع الأول من العمر.

- يفضل إضافة فيتامين A D_3 هـ في مياه الشرب في اليوم الأول، ثم يضاف مضاد حيوي مناسب لمدة ٤ أيام، وبعد ذلك لمدة يومين مرة أخرى.

التسويق:

- يسوق السمان عند عمر ٣٧ يوماً، ويكون متوسط الوزن ١٩٠ جم تقريراً، وبطبيعة الحال فإن وزن السمان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتركيبة العلف.



■ السمان هو الطائر الوحيد الذي يعطي بيضًا عند عمر ٤٥ يوماً فقط

الخصوصية كما تزايد نسبة التشوهات بعد هذا العمر.

التغذية:

- تستخدم المفرخات الخاصة بالدجاج بعد تعديل أدراج وضع البيض لتتناسب مع حجم بيض السمان، ويفقس البيض بعد ١٧ يوماً.

- تضبط درجة حرارة المفكس عند ٩٩.٥ ± ٠.٥ فـ٪ والرطوبة النسبية ٦٠ ٪ حتى اليوم ١٤ ، وخلال هذه الفترة يتم تقليل البيض كل $٤-٢$ ساعات، ثم ينقل البيض إلى أدراج الفقس حيث

السمان هو الطائر الوحيد الذي يعطي بيضًا عند عمر ٤٥ يوماً فقط، وفترة حضانة البيض قصيرة جداً فهي ١٧ يوماً فقط.

الطريقة المثلثة للتربية قطيع أمهات السمان

تفضل تربية الأمهات في بطاريات مخصصة للسمان ويوضع فيها السمان بنسبة ذكر واحد لكل ثلاثة إناث. ويكون متوسط الوزن عند عمر ٦٠ يوماً للذكر ٢٥٠ جراماً وللأنثى ٣٠٠ جرام تقريرياً، ولا يتم جمع البيض للتفریخ قبل عمر ٦٠ يوماً.

البيئة المثالية للتربية:

في بطارية الأمهات يكون عدد ساعات الإضاءة $١٨-١٧$ ساعة يومياً (لا يفضل ضوء الشمس المباشر)، كما يجب أن تكون أرضية العنبر خرسانية وتهويته جيدة.

جمع بيض الأمهات:

يجمع البيض مرتين يومياً على الأقل ويراعي النقاط التالية:

١- يستبعد البيض الصغير والكبير، ولا يستخدم سوى البيض متوسط الحجم.

٢- يحفظ البيض في مكان بارد (٩٤ تقريرياً).

٣- لا تزيد فترة حفظ البيض على أسبوع.

٤- يجب معاملة البيض بحرص شديد؛ لأن القشرة الخارجية لبيض السمان رقيقة نسبياً.

٥- يُتصح بعدم تربية الأمهات بعد عمر ٦ شهور؛ حيث تقل نسبة