

أهم مشكلات فترة الحضانه في الكتاكيت وكيفية علاجها

د. مصطفى فايز

كلية الطب البيطرى - جامعة قناة السويس

- يواجه المربيون عدداً من المشكلات فى مرحلة الحضانه فى الكتاكيت، تؤثر فيما بعد فى سائر عمليات تربية القطيع الداجنى.. وفيما يلى نستعرض أهم هذه المشكلات وكيفية علاجها:
- 1- بلل الكتاكيت وصراخها: نتيجة عدم جودة التهوية أو لزيادة الرطوبة أو لإصابتها بالإسهال أو لانخفاض درجة الحرارة أو التزاحم. ويعالج بإزالة مسببات.
 - 2- الترييش الضعيف: يرجع لنقص فى التغذية وارتفاع الحرارة والعوامل الوراثية. ويعالج بإزالة مسببات.
 - 3- الافتراس: يرجع لنقص فى التغذية وخاصة الأملاح أو نقص البروتين أو نقص الفيتامينات أو زيادة الألياف أو الازدحام أو عدم فصل الجنسين أو الحرارة غير المناسبة أو عوامل وراثية أو تربية كتاكيت مختلفة فى العمر. ويعالج بإزالة مسببات، وكذلك مراعاة الآتى:
 - أ- قص ثلث المنقار العلوى للكتكوت بالآلة الخاصة بذلك بعد الفقس مباشرة أو فى أول يوم لوصول الكتاكيت للمزرعة.
 - ب- ضمان اتزان العليقة، حيث إن نقص بعض مكوناتها يؤدى إلى لجوء الكتاكيت لاستكمال هذا النقص عن طريق النقر والافتراس.
 - ج- تجنب تزاحم الكتاكيت ومراعاة المساحات اللازمة للتربية.
 - د- ارتفاع نسبة النقص: يرجع لنقص فى التغذية أو الإصابة بالأمراض أو أى عامل من العوامل البيئية. ويعالج بإزالة مسببات.

- 5- ضعف الأرجل: يرجع لنقص فيتامين «د» أو الضوء أو الكالسيوم. ويعالج بإزالة مسببات.

- 6- انزلاق الأربطة العضلية: يرجع إلى نقص فى الأملاح المعدنية، ويعالج بإزالة مسببات.

- 7- انثناء الأقدام للداخل: نقص فى الريبوفلافين. ويعالج بتلافى الأسباب.

